

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PRACOWNIA USG

| Usługa | Cena |
|---|--------|
| Badania USG Dorosłych | |
| USG Szyi | 110 zł |
| USG Tarczycy | 110 zł |
| USG Ślinianek | 110 zł |
| USG Obwodowych węzłów chłonnych (pachwinowe, pachowe, szyjne) | 110 zł |
| USG Jamy brzusznej | 110 zł |
| USG Jamy brzusznej z oceną układu moczowego | 120 zł |
| USG Układu moczowego | 110 zł |
| USG Jąder | 120 zł |
| USG Piersi | 120 zł |
| USG Stawu kolanowego | 120 zł |
| USG Ścięgna Achillesa | 120 zł |
| USG Tkanek miękkich | 110 zł |
| USG Gruczołu krokowego | 110 zł |
| USG Ginekologiczne (przez powłoki brzuszne lub TV) | 110 zł |
| Badania USG Dzieci | |
| USG Jamy brzusznej | 120 zł |
| USG Tarczycy | 120 zł |
| USG Obwodowych węzłów chłonnych (pachwinowe, pachowe, szyjne) | 120 zł |
| USG Stawów biodrowych (u niemowląt) | 120 zł |
| USG Jąder | 120 zł |
| USG Przechięciączkowe głowy (u niemowląt) | 120 zł |
| Badania USG Doppler | |
| USG Doppler tętnic nerkowych | 120 zł |
| USG Doppler układu wrotnego wątroby | 120 zł |
| USG Doppler aorty brzusznej i tętnice biodrowe | 120 zł |
| USG Doppler tętnic szyjnych i domózgowych | 120 zł |
| USG Doppler żył lub tętnic jedna ręka | 120 zł |
| USG Doppler żył lub tętnic obu rąk | 210 zł |
| USG Doppler żył lub tętnic jedna noga | 120 zł |
| USG Doppler żył lub tętnic obu nóg | 210 zł |
| Echo Doppler serca (usg serca) | 120 zł |

USG jamy brzusznej

Przed badaniem należy około 6 godzin pozostać na czczo, a w przeddzień badania dieta powinna być lekkostrawna. Wskazane jest na 1 godzinę przed badaniem wypić 0,5 – 1,0 litra niegazowanego płynu (woda). Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.

Umożliwia ocenę narządów wewnętrznych jamy brzusznej – wielkość, kształt, strukturę narządów takich jak: wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, trzustka, śledziona, nerki, pęcherz moczowy (jeśli jest wypełniony).

USG układu moczowego

W przeddzień badania dieta powinna być lekkostrawna a w dniu badania około 6 godzin należy pozostać na czczo. Wskazane jest na 1 godzinę przed badaniem wypić 0,5-1,0 litra niegazowanego płynu (woda). Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.

Umożliwia obrazowania narządów układu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza moczowego).

Wskazaniem do wykonania badania USG układu moczowego jest podejrzenie lub stwierdzenie chorób układu moczowego, takich jak:

- kamica nerkowa, moczowodowa,
- zmiany zapalne nerek, układu moczowego,
- podejrzenie ropni, gruźlicy w obrębi układu moczowego,
- schorzenia pęcherza moczowego,
- bezmocz lub znacznego zmniejszenia ilości oddawanego moczu, niezależne od ilości wypitych płynów.

USG gruczołu krokowego

Do badania koniecznie należy mieć wypełniony pęcherz moczowy, w tym celu na 1 godzinę przed badaniem należy wypić 1-1,5 litra płynu niegazowanego i nie oddawać moczu.

Wykonywane jest za pomocą sondy USG przyłożonej bezpośrednio do powłok brzusznych. Badanie obejmuje ocenę pęcherza moczowego, ogólną ocenę prostaty (gruczołu krokowego), oraz ocenę zalegania moczu po opróżnieniu pęcherza. Wskazaniem do badania USG gruczołu krokowego są niepokojące objawy, mogące świadczyć o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu prostaty, zaburzenia w funkcjonowaniu układu moczowego, dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej.

USG piersi

Najlepiej wykonywać badanie między 1-10 dniem cyklu miesięczkowego. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań, w tym mammografii (jeśli była wykonana).

Wskazaniem do badania są zmiany w gruczołach piersiowych, np. o charakterze guzków wykrytych badaniem palpacyjnym lub diagnostyka zmian wykrytych podczas badania mammografii. USG wykonywane jest również jako badanie profilaktyczne u młodych kobiet. Badanie wykonywane jest u pacjentek w każdym wieku, jest bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie bez narażania pacjentki na szkodliwe promieniowanie.